



PLANTENZIEKTENKUNDIGE DIENST, WAGENINGEN

Lijst met erkende lok- en vanggewassen die ingezet kunnen worden als maatregel ter bestrijding van aardappelmoehheid.

Lokgewas

*Solanum sisymbriifolium** Raketblad

Vanggewas

*Solanum tuberosum*** Aardappel

Wageningen, juli 2008

* Voor het gebruik van raketblad als lokgewas gelden de volgende voorwaarden:

- Er moeten voldoende planten aanwezig zijn per m² (minimaal 9-10 planten/m²)
- Het gewas moet zich voldoende tijdig ontwikkelen (i.v.m. lokken van cysten) om het beoogde bestrijdingseffect te kunnen realiseren.

**Voor het gebruik van aardappelen als vanggewas gelden de volgende voorwaarden:

- Uitvoering is alleen toegestaan in het voorjaar
- Het gebruikte pootgoed voldoet aan eisen van wet- en regelgeving (incl. PA-verordeningen)
- Teelt is uitsluitend toegestaan op bedden of vlakvelden (geen ruggenteelt!) Een regelmatige verdeling van de planten, met een dichtheid van minimaal 9 planten per m². Dit kan bijvoorbeeld bereikt worden met een poot- en rijafstand van 30 cm
- Het vanggewas moet uiterlijk op de 40e dag na poten door middel van een behandeling met glyfosaat worden gedood
- Op het perceel rusten geen andere besmetverklaringen dan die van aardappelmoehheid (bijv. bruinrot) die de teelt van aardappelen verbieden
- Het besmette perceel ligt niet in een zogeheten aardappelverbodsgebied (PA verordening)

PA = Productschap Akkerbouw (website: www.productschapakkerbouw.nl)